

# MÊS DO CANCRO DA BEXIGA

Maio  
é o Mês  
de Awareness  
do Cancro  
da Bexiga



Em 2014 a incidência de cancro da bexiga em Portugal situou-se em **17,6 por cada 100 000 habitantes**, e esse valor subiu para **29 em cada 100 000 habitantes** considerando apenas o sexo masculino.<sup>1</sup>

## Os sintomas mais frequentes são:

Estes sintomas não são exclusivos do cancro da bexiga, podem ocorrer em outras doenças, sendo importante uma avaliação médica quando detetados.



- Sangue na urina
- Problemas a urinar
- Dores abdominais ou lombares
- Perda de peso inexplicável



O cancro da bexiga é considerado o **quinto cancro mais frequente** na Europa

## O risco de cancro da bexiga aumenta com a idade.

Cerca de **7 em cada 10 pessoas** com cancro da bexiga têm **idade superior a 65 anos**.<sup>2,3</sup>



### Referências:

- 1 - Direção Geral da Saúde. Programa Nacional para as Doenças Oncológicas. Doenças Oncológicas em números. 2014.
- 2 - American Society of Clinical Oncology. Guide for Bladder Cancer. Disponível em <http://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/view-all>;
- 3 - Bladder cancer: a guide for patients. Information Based on ESMO Clinical Practice Guidelines - v.2016.1. Anticancer Fund. Disponível em: <http://www.esmo.org/content/download/6589/114929/file/Bladder-Cancer-Guide-for-Patients-ACF-ESMO.pdf>.